75 pts

République Algérienne Démocratique et Populaire
Université Mouloud Mammeri de Tizi Ouzou

Faculté de Médecine **Département de médecine**

Médecine sociale.
Partie d'épidémiologie.

Examen de Rattrapage
Dimanche le 21.06.2015 à 09h

Exercice. On a tiré sort parmi des femmes de 20 à 45 ans, un échantillon de 1000 sujets, qui ont été classée en deux groupes « femmes mises sous contraceptifs oraux » et « femmes sans contraceptifs oraux » ;

Elles ont été suivies pendant 10ans en vue d'observer le nombre de cas de thrombophlébite.

Répartition des cas thrombophlébite chez les femmes de 20 à 45ans, en fonction de la prise de contraceptifs oraux.

	Nombre de sujets suivis	Cas de thrombophlébite
Sans prise de COC	750	45
Prise de contraceptifs oraux	250	28
Total	1000	73

1- De quel type d'étude s'agit-il ?
2- Définissez et calculez les indicateurs de santé.
3- Définissez et calculez les mesures d'association appropriées ?et commentez.
4- Existe-une relation entre la survenue de thrombophlébite et la prise de contraceptifs oraux ?

Questions :

1- Quels sont les axes de la prévention contre les maladies non transmissibles.

2- Quelles sont les vaccinations que doit recevoir un enfant âgé de 6ans conformément au programme de vaccination.

Bon courage !